

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11 N° de publication :
(A n'utiliser que pour
le classement et les
commandes de reproduction).

2.178.718

21 N° d'enregistrement national :
(A utiliser pour les paiements d'annuités,
les demandes de copies officielles et toutes
autres correspondances avec l'I.N.P.I.)

72.11734


DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

1^{re} PUBLICATION

- 22 Date de dépôt 4 avril 1972, à 14 h 39 mn.
41 Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — «Listes» n. 46 du 16-11-1973.
- 51 Classification internationale (Int. Cl.) A 61 k 27/00//C 07 d 7/00.
- 71 Déposant : Société dite : SANDOZ S.A. Société par actions, résidant en Suisse.
- 73 Titulaire : *Idem* 71
- 74 Mandataire :
- 54 Nouveaux composés hétérocycliques, leur préparation et leur application comme médicaments.
- 72 Invention de : William J. Roulihan et Jeffrey Nadelson.
- 33 32 31 Priorité conventionnelle :

La présente invention a pour objet de nouveaux composés hétérocycliques, leur préparation et leur application en thérapeutique, à titre de principes actifs de médicaments.

L'invention concerne plus particulièrement les composés
5 répondant à la formule I



dans laquelle

les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents,
20 représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,

les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore,
25 un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R₁, adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,

R₂ représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5
30 atomes de carbone,

R₃ et R₄, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R₃ et R₄ forment ensemble, avec l'atome
35 d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle

dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone, R_5 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et

X représente le groupe méthylène ou carbonyle et


5 - trois substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,

10 - R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et

- deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins.

Selon le procédé de l'invention, pour préparer les composés de formule I

15 a) on cyclise, par chauffage à une température supérieure à 100° , un composé de formule II




30 dans laquelle R , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 et R_5 ont les significations déjà données et R_7 représente un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou un groupe benzyle, ce qui donne un composé de formule Ia

35

(formule Ia voir page suivante)

5

10




(Ia)

15 dans laquelle R, R₁, R₂, R₃, R₄ et R₅ ont les significations déjà données.

On effectue la réaction de préférence dans un solvant organique inerte, comme par exemple un éther, tel que l'éther diéthylique, un hydrocarbure ou un hydrocarbure halogéné tel que l'hexane, l'heptane, le benzène, le toluène ou l'o-dichloro-
20 benzène. On opère à une température au moins égale à 100°, de préférence comprise entre 140 et 160°. On peut également opérer à une température comprise entre 220 et 250°. La durée de la réaction est habituellement comprise entre 15 et 48 heures, et entre 20 et 28 heures sous les conditions préférées. Cependant, ni la
25 température ni le solvant utilisés ne sont déterminants. Si on effectue la réaction en absence d'oxygène, par exemple sous atmosphère inerte comme l'azote, les rendements ont tendance à augmenter et le produit obtenu est de meilleure qualité.

30 b) On réduit un composé de formule Ia, représentée et définie ci-dessus, par un borohydrure de métal alcalin dans un solvant organique inerte, en présence d'éthérate de trifluorure de bore et à une température comprise entre -20 et 80°, et on traite le produit d'addition ainsi obtenu par un acide concentré, à une température comprise entre 40° et la température
35 de reflux du mélange réactionnel, ce qui donne un composé de formule Ib



dans laquelle R, R₁, R₂, R₃, R₄ et R₅ ont les significations déjà données.

15 Le composé de formule Ia peut être mis en jeu sous forme de base libre ou sous forme de sel d'addition d'acides. L'agent de réduction est de préférence le borohydrure de sodium ou de lithium. Comme solvant organique inerte approprié, on peut citer le tétrahydrofuranne ou l'éther diméthylque du diéthylène-


20 glycol (diglyme). On opère de préférence à une température élevée, par exemple comprise entre 50 et 60° et pendant environ une demi-heure à 2 heures, de préférence pendant une heure. Cependant, ni le solvant ni la température ne sont déterminants. L'acide concentré qui convient pour la seconde étape de la réaction est

25 l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique concentrés, ou, de préférence, l'acide acétique glacial. Cette réaction peut être effectuée dans un solvant organique inerte, tel que l'éther ou le tétrahydrofuranne, et est effectuée de préférence à la température de reflux du mélange réactionnel. Cependant, ni la température


30 ni les solvants utilisés ne sont déterminants. Il est avantageux de chasser le solvant utilisé dans la première étape de ce procédé sans isoler l'intermédiaire et d'introduire le solvant qui convient pour la deuxième étape.

35 Les composés de formule Ia et Ib peuvent ensuite être isolés et purifiés selon les méthodes habituelles, par exemple par cristallisation.

Les composés de formule II, utilisés comme produits de départ, peuvent être préparés par condensation, dans un solvant organique inerte et en absence d'oxygène, d'un composé de formule III



10 dans laquelle R, R₁, R₂ et R₇ ont les significations déjà données, avec un composé de formule IV



20 dans laquelle R₁, R₃, R₄ et R₅ ont les significations déjà données, suivie d'une hydrolyse du produit de la réaction.

Comme solvant inerte approprié, on peut utiliser l'éther diéthylique, le tétrahydrofuranne, l'hexane, l'heptane ou
25 le benzène. On effectue convenablement la réaction sous atmosphère inerte, par exemple sous atmosphère d'azote, et à une température comprise entre -80 et -20°, de préférence comprise entre -60 et -40°. On ajoute de préférence le composé de
30 formule IV dans un solvant inerte à une solution refroidie entre -60 et -40° du composé de formule III dans un solvant inerte. Le temps de réaction est compris entre environ 1 et 3 heures. On effectue l'hydrolyse selon les méthodes habituelles, de préférence avec une solution aqueuse de chlorure d'ammonium et à une
35 température comprise entre -20 et 0°. Les solvants, températures et agents d'hydrolyse utilisés ne sont pas déterminants. Les composés de formule II peuvent être ensuite isolés et purifiés

selon les méthodes habituelles.

Certains composés de formule III et de formule IV sont connus ou peuvent être préparés selon les méthodes connues à partir de produits connus.

- 5 Certains composés de formule I et II existent sous forme racémique ou sous forme d'isomères optiques. De plus, certains composés de formule I, en particulier ceux dans lequel R_5 représente un groupe alkyle, peuvent exister sous forme de mélange de diastéréomères. On peut séparer et isoler ces isomères
10 qui font également partie de la présente invention selon les méthodes habituelles.

Les exemples suivants illustrent la présente invention sans aucunement en limiter la portée. Les températures sont toutes exprimées en degrés centigrades.

15 Exemple 1

o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthylbenzamide

- Dans un ballon muni d'un agitateur, d'une ampoule à brome, d'un réfrigérant et d'un tube d'admission de gaz, on introduit, à la température ambiante et sous atmosphère d'azote,
20 40 g (0,28 mole) de o-méthyl-N-méthylbenzamide et 250 ml de tétrahydrofurane anhydre. Le ballon est immergé dans un bain de glace et refroidi à une température intérieure de 5°. On commence à agiter la solution et on ajoute goutte à goutte, en l'espace
25 de d'environ une heure, 380 ml de n-butyl-lithium 1,6 M (0,616 mole) dans de l'hexane, tout en maintenant la température en dessous de 8°. On agite le sel dilithique rouge obtenu pendant une heure à 5° et on refroidit le ballon à une température intérieure de -60° par immersion dans un bain de neige carbonique et
30 d'acétoné. A ce mélange refroidi, on ajoute goutte à goutte, en l'espace d'environ 45 minutes et tout en maintenant la température entre -60 et -50°, une solution de 49,7 g (0,28 mole) de 3-diméthylaminopropiophénone dans 140 ml de tétrahydrofurane anhydre. On agite le mélange réactionnel à -60° pendant une heure,
35 puis on le laisse revenir à 0° en une heure environ et on le traite par 200 ml d'une solution aqueuse saturée de chlorure d'ammo-

nium, tout en maintenant la température en dessous de 10°. Le solide obtenu est filtré, lavé complètement à l'eau et recristallisé dans un mélange à parts égales de chlorure de méthylène et d'éther. On obtient ainsi le o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide qui fond à 139,5-140,5°.

En procédant comme décrit ci-dessus, mais en employant à la place du o-méthyl-N-méthyl-benzamide des quantités équivalentes de produits de départ indiqués ci-dessous, on obtient les composés de formule II suivants:

10	<u>Produits de départ</u>	<u>Composés de formule II</u>
	a) o-méthyl-N-allyl-benzamide	o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-allyl-benzamide;
	b) o-méthyl-N-benzyl-benzamide	o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-benzyl-benzamide;
15	c) 2-méthyl-6-méthoxy-N-méthyl-benzamide	2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-6-méthoxy-N-méthyl-benzamide;
	d) 4-chloro-2-méthyl-N-méthyl-benzamide	4-chloro-2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide;
20	e) 2,3-diméthyl-N-méthyl-benzamide	2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-3,N-diméthyl-benzamide;
	f) 2-méthyl-5-trifluorométhyl-N-méthyl-benzamide	2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-5-trifluorométhyl-N-méthyl-benzamide.

25 En procédant comme décrit ci-dessus, mais en employant à la place de la 3-diméthylaminopropiophénone les produits de départ de formule IV indiqués ci-dessous, on obtient les composés de formule II suivants:

	<u>Produits de départ de formule IV</u>	<u>Composés de formule II</u>
30	g) 3',4'-dichloro-3-diméthylamino-propionophénone	o-[3,4-dichloro- β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide, F = 130-131°;
	h) 3-diméthylamino-4'-méthoxy-propionophénone	o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-4-méthoxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide;
35	i) 3-(4-méthyl-1-pipérazinyl)propionophénone	o-[β -hydroxy- β -(2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl)phénéthyl]-N-méthyl-benzamide;

- j) 3-morpholinopropiophénone o-[β -hydroxy- β -(2-morpholino-éthyl)-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- k) 3-diméthylamino-2-méthylpropiophénone o-[β -(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- 5 l) 3-thiomorpholino-propio-phénone o-[β -hydroxy- β -(2-thiomorpholino-éthyl)-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- m) 3-(1-pyrrolidinyl)-propio-phénone o-[β -hydroxy- β -(2-(1-pyrrolidinyl)-éthyl)-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- 10 n) 3-pipéridino-propiophénone o-[β -hydroxy- β -(2-pipéridino-éthyl)-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- o) 3-diallylamino-2'-méthylpropiophénone o-[β -(2-diallylamino-éthyl)- β -hydroxy-2-méthyl-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- 15 p) 3-dibenzylamino-3'-trifluorométhyl-propiophénone o-[β -(2-dibenzylamino-éthyl)- β -hydroxy-3-trifluorométhyl-phénéthyl]-N-méthylbenzamide ;
- q) 3-diméthylamino-3',4'-méthylènedioxy-propiophénone o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-3,4-méthylènedioxy-phénéthyl]-N-méthylbenzamide.

20

Exemple 23-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine

Dans un ballon muni d'un agitateur, d'un réfrigérant et d'une arrivée de gaz, on introduit, sous atmosphère d'azote et à la température ambiante, 16,3 g (0,05 mole) de o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthylbenzamide et 25 170 ml de o-dichlorobenzène. On commence à agiter et on chauffe le mélange réactionnel au reflux pendant 18 heures. On élimine l'excès d'o-dichlorobenzène par distillation sous pression réduite et on fait cristalliser l'huile résultante dans l'éther. On 30 obtient ainsi la 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine qui fond à 95-95,5°.

En procédant comme décrit ci-dessus, mais en employant à la place du o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthylbenzamide les produits de départ de formule II indiqués 35 ci-dessous, on obtient les composés de formule I suivants:

Produits de départ

- a) o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-allyl-benzamide
- 5 b) o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-benzyl-benzamide
- c) 2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-6-méthoxy-N-méthyl-benzamide
- 10 d) 4-chloro-2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide
- e) 2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-3,N-diméthyl-benzamide
- f) 2-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-5-trifluorométhyl-N-méthyl-benzamide
- 15 g) o-[3,4-dichloro- β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide
- 20 h) o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-4-méthoxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide
- i) o-{ β -hydroxy- β -[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl]phénéthyl}-N-méthyl-benzamide
- 25 j) o-[β -hydroxy- β -(2-morpholino-éthyl)phénéthyl]-N-méthyl-benzamide
- k) o-[β -(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)- β -hydroxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide
- 30 l) o-[β -hydroxy- β -(2-thiomorpholino-éthyl)phénéthyl]-N-méthyl-benzamide
- m) o-{ β -hydroxy- β -[2-(1-pyrrolidiny)éthyl]phénéthyl}-N-méthyl-benzamide
- 35

Produits finals

- 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine, F = 95-95,5°;
- 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine, F = 95-95,5°;
- 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-8-méthoxy-3-phényl-isocoumarine;
- 6-chloro-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine;
- 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-5-méthyl-3-phényl-isocoumarine;
- 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-7-trifluorométhyl-isocoumarine;
- 3-(3,4-dichlorophényl)-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-isocoumarine, le chlorhydrate fond à 286-287° ;
- 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(4-méthoxyphényl)-isocoumarine, F = 87-88°;
- 3,4-dihydro-3-[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl]-3-phényl-isocoumarine, F=134-135,5°;
- 3,4-dihydro-3-(2-morpholino-éthyl)-3-phényl-isocoumarine, F = 120-121°;
- 3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine, F = 132-134°;
- 3,4-dihydro-3-phényl-3-(2-thiomorpholino-éthyl)-isocoumarine;
- 3,4-dihydro-3-phényl-3-[2-(1-pyrrolidiny)éthyl]-isocoumarine;

- | | | |
|----|---|--|
| n) | o-[β -hydroxy- β -(2-pipéridino-éthyl)-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide | 3,4-dihydro-3-phényl-3-(2-pipéridino-éthyl)-isocoumarine; |
| o) | o-[β -(2-diallylamino-éthyl)- β -hydroxy-2-méthyl-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide | 3-(2-diallylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(o-tolyl)-isocoumarine, F = 173,5-174,5°; |
| p) | o-[β -(2-dibenzylamino-éthyl)- β -hydroxy-3-trifluorométhyl-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide | 3-(2-dibenzylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(3-trifluorométhylphényl)-isocoumarine; |
| q) | o-[β -(2-diméthylamino-éthyl)- β -hydroxy-3,4-méthylènedioxy-phénéthyl]-N-méthyl-benzamide | 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(3,4-méthylènedioxyphényl)-isocoumarine. |

Exemple 3

3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-isochromanne

- On ajoute en une fois 177 g (0,126 mole) d'éthérate de trifluorure de bore (160 ml) à une solution de 13 g (0,042mole) de 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine dans 220 ml d'éther diméthylque du diéthylèneglycol (diglyme). On ajoute goutte à goutte le mélange ainsi obtenu à une solution de 3,2 g (0,084 mole) de borohydrure de sodium dans 220 ml de diglyme, tout en agitant et en maintenant la température à 0°.
- Lorsque l'addition est terminée, on chauffe le mélange ainsi obtenu à 55° pendant une heure, puis on le refroidit dans la glace et on le traite avec 100 ml d'eau que l'on ajoute goutte à goutte, tout en maintenant la température à environ 5°. On élimine les solvants sous pression réduite et on traite le résidu d'évaporation par de l'éther. On dissout le produit d'addition insoluble du borohydrure dans 320 ml de tétrahydrofurane contenant 120 ml d'acide acétique glacial et on chauffe au reflux pendant 4 heures. On élimine les solvants sous pression réduite, on dissout le résidu dans de l'eau, on l'alcalinise par addition d'hydroxyde de potassium solide et on l'extrait à l'éther. On sèche l'extrait éthéré sur sulfate de magnésium anhydre, on le filtre, on le refroidit avec de la glace et on le traite par de l'acide chlorhydrique gazeux. On filtre le précipité qui s'est formé et on le recristallise dans un mélange de chlorure de méthylène et d'éther. On obtient ainsi le chlorhydrate de

3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-isochromanne qui fond à 164,5-165°.

En procédant comme décrit ci-dessus, mais en employant à la place de la 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine les produits de départ indiqués ci-dessous, on obtient les chlorhydrates des composés de formule I suivants:

	<u>Produits de départ</u>	<u>Produits finals de formule I</u>
	a) 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-8-méthoxy-3-phényl-isocoumarine	3-(2-diméthylamino-éthyl)-8-méthoxy-3-phényl-isochromanne;
10	b) 6-chloro-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	6-chloro-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-isochromanne;
	c) 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-5-méthyl-3-phényl-isocoumarine	3-(2-diméthylamino-éthyl)-5-méthyl-3-phényl-isochromanne;
15	d) 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-7-trifluorométhyl-isocoumarine	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-7-trifluorométhyl-isochromanne;
	e) 3-(3,4-dichlorophényl)-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-isocoumarine	3-(3,4-dichlorophényl)-3-(2-diméthylamino-éthyl)-isochromanne;
20	f) 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(4-méthoxyphényl)-isocoumarine	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-(4-méthoxyphényl)-isochromanne; le succinate fond à 136,5-137,5°;
	g) 3,4-dihydro-3-[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl]-3-phényl-isocoumarine	3-[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl]-3-phényl-isochromanne;
25	h) 3,4-dihydro-3-(2-morpholino-éthyl)-3-phényl-isocoumarine	3-(2-morpholino-éthyl)-3-phényl-isochromanne;
	i) 3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3-phényl-isochromanne;
30	j) 3,4-dihydro-3-phényl-3-(2-thiomorpholino-éthyl)-isocoumarine	3-phényl-3-(2-thiomorpholino-éthyl)-isochromanne;
	k) 3,4-dihydro-3-phényl-3-[2-(1-pyrrolidinyl)éthyl]-isocoumarine	3-phényl-3-[2-(1-pyrrolidinyl)éthyl]-isochromanne;
35	l) 3,4-dihydro-3-phényl-3-(2-pipéridino-éthyl)-isocoumarine	3-phényl-3-(2-pipéridino-éthyl)-isochromanne;

- 5 m) 3-(2-diallylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(o-tolyl)-isocoumarine 3-(2-diallylamino-éthyl)-3-(o-tolyl)-isochromanne;
- n) 3-(2-dibenzylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(3-trifluorométhylphényl)-isocoumarine 3-(2-dibenzylamino-éthyl)-3-(3-trifluorométhylphényl)-isochromanne;
- o) 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(3,4-méthylènedioxyphényl)-isocoumarine 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-(3,4-méthylènedioxyphényl)-isochromanne.

10 Les composés de formule I n'ont pas été décrits jusqu'à présent dans la littérature. Dans les essais effectués sur les animaux de laboratoire, ils se distinguent par d'intéressantes propriétés pharmacodynamiques, en exerçant notamment une action diurétique.

15 L'action diurétique des composés de formule I a été mise en évidence chez le rat éveillé après administration de la substance à essayer par voie orale. On opère selon une modification de la méthode décrite par Roy Aston dans Toxicol. appl. Pharmacol. 1, 277(1959). La détermination du sodium et du potassium est effectuée par photométrie de flamme. Dans cet

20 essai, les composés de formule I exercent une nette action diurétique. Les résultats obtenus avec certains composés de l'invention sont rassemblés dans le tableau I suivant:

TABLEAU I

25	Substance	Dose administrée en mg/kg (voie orale)	Action diurétique
30	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	12,5	+ + +
35	3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	25,0	+ + +

TABLEAU I (suite)

5	3-(2-diméthylamino-éthyl)- 3,4-dihydro-3-(p-méthoxy- phényl)-isocoumarine	25,0	+ + +
---	---	------	-------

+ + + Effet prononcé.

Les composés de formule I exercent également un effet
10 hypotenseur. Pour déterminer l'effet hypotenseur, on étudie
l'influence de la substance à essayer sur l'effet presseur
provoqué par exemple par les amines biogènes, en se servant
de chiens sous narcose qu'on prépare selon une technique déri-
vant de celle décrite par Markowitz (Experimental Surgery,
15 Williams and Wilkins, Baltimore 1949); le composé à essayer
est administré par voie intraveineuse. La pression sanguine est
mesurée au moyen d'un manomètre à mercure ou d'un système de
transmission, à partir d'un cathéter placé dans l'artère caro-
tide ou l'artère fémorale de l'animal; l'enregistrement se fait
20 au moyen d'un appareil électrique approprié.

On a également déterminé l'effet hypotenseur/anti-
hypertenseur sur le rat éveillé chez lequel on a au préalable
provoqué une hypertension selon la méthode décrite par A.
Grollman dans Proc. Soc. Exptl. Biol. and Med. 57, 103 (1944).
25 La pression sanguine est déterminée sur la queue de l'animal
au moyen de la manchette habituelle ; on administre la subs-
tance à essayer par voie orale.

Dans ces essais, les composés de formule I exercent
un net effet hypotenseur /anti-hypertenseur. Les résultats obtenus
30 sont rassemblés dans le tableau II suivant:

TABLEAU II

35	Substance	Essai sur le	Dose administrée en mg/kg (mode d'administration)	Effet hypoten- seur/anti-hy- pertenseur
	3-(2-diméthylamino- éthyl)-3,4-dihydro- 3-phényl-isocoumarine	Chien	5,0 (voie intraveineuse)	+ +

TABLEAU II (suite)

5	3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	Rat (voie orale)	100,0	+
10	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(p-méthoxyphényl)-isocoumarine	Chien (voie intra-veineuse)	5,0	+ + +
		Rat (voie orale)	100,0	+ + +
	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-isochromanne	Chien (voie intra-veineuse)	5,0	+ + +

15 + Effet significatif

+ + Effet modéré

+ + + Effet prononcé

20 Grâce à ces propriétés, les composés de formule I peuvent être utilisés comme diurétiques ou comme hypotenseurs/antihypertenseurs. La dose quotidienne à administrer sera comprise entre 50 et 1500 mg de substance active.

Toxicité aiguë

25 Pour déterminer la toxicité aiguë des composés de formule I chez la souris, on administre le composé à étudier par voie intrapéritonéale, dissous dans un volume de 0,1 ml/10 g de poids corporel. Le calcul de la dose létale 50 % s'effectue selon la méthode décrite par L.J. Reed et H. Muench dans Amer. J. Hyg. 27, 493 (1938), et par H.N. Wright dans J.Amer.Pharm. Assoc. 30, 177 (1941). Les résultats obtenus pour la DL₅₀ sont rassemblés dans le tableau III suivant.

TABLEAU III

35	Substance	DL ₅₀ en mg/kg (voie intrapéritonéale)
	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	150

TABLEAU III (suite)

5	3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)- 3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine	184
	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4- dihydro-3-(p-méthoxyphényl)-isocou- marine	800
10	3-(2-diméthylamino-éthyl)-3- phényl-isochromanne	91,6

En tant que médicaments, les composés de formule I et leurs sels peuvent être administrés par voie orale, parentérale ou rectale, soit seuls, soit sous forme de compositions pharmaceutiques appropriées, telles que des comprimés, des poudres, des granulés, des capsules, des élixirs, des suspensions, des sirops, des solutions ou des suspensions injectales, ou des suppositoires.

Les préparations pharmaceutiques destinées à l'administration par voie orale peuvent contenir, outre la substance active, un ou plusieurs excipients organiques ou minéraux acceptables du point de vue pharmaceutique, ainsi que des édulcorants, des aromatisants, des colorants, des agents de conservation etc... Pour la préparation des comprimés on pourra utiliser, comme excipients, le carbonate de calcium, le carbonate de sodium, le lactose, le talc, etc..., des agents de granulation et de désagrégation tels que l'amidon, l'acide alginique etc., des liants tels que l'amidon, la gélatine, la gomme arabique etc., des lubrifiants tels que le stéarate de magnésium, l'acide stéarique, le talc etc... Les comprimés peuvent être revêtus ou non. Le revêtement a pour but, entre autres, de retarder la décomposition et l'absorption de la substance active dans le tractus gastro-intestinal et de produire ainsi un effet retard. Les suspensions, les sirops et les élixirs peuvent contenir, outre la substance active, des agents de suspension tels que la méthylcellulose, la gomme adragante,

l'alginat de sodium etc., des mouillants tels que la lécithine, le stéarate de polyoxyéthylène, le mono-oléate de polyoxyéthylènesorbitane, et des agents de conservation tels que le p-hydroxy-benzoate d'éthyle. Les capsules peuvent contenir la substance active soit seule, soit en mélange avec des excipients inertes solides, comme par exemple le carbonate de calcium, le phosphate de calcium et le kaolin.

Les solutions et suspensions injectables peuvent être préparées de manière connue et contenir, outre la substance active, des solvants, des solubilisants, des agents de dispersion ou des mouillants appropriés et des agents de suspensions identiques ou semblables à ceux cités plus haut.

Les suppositoires peuvent être préparés de manière connue et contiennent, outre la substance active, des graisses, des huiles naturelles ou durcies, des cires etc...

Les formes médicamenteuses préférées du point de vue de leur préparation et de leur facilité d'administration sont les compositions solides, en particulier les comprimés et les capsules.

Pour leur utilisation en thérapeutique, les composés de formule I peuvent être administrés sous forme de bases libres ou sous forme de sels acceptables du point de vue pharmaceutique. Ces sels, dont l'activité est du même ordre que celle des bases libres correspondantes, sont ceux formés par exemple avec des acides minéraux tels que l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique, ou avec des acides organiques tels que l'acide succinique, l'acide benzoïque, l'acide acétique, l'acide p-toluène-sulfonique, l'acide benzène-sulfonique, l'acide maléique, l'acide malique, l'acide tartrique, l'acide citrique, l'acide méthane-sulfonique ou l'acide cyclohexyl-sulfamique.

Pour son application en thérapeutique, le 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-isochroman est particulièrement intéressant.

72 11734

17


2178718

Exemple de composition pharmaceutique : capsules

Composé de formule I, par exemple	
1a 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-	
dihydro-3-phényl-isocoumarine	25 mg
5 Excipient inerte (amidon, kaolin,	
lactose, etc..)	275 mg
Pour une capsule pesant	300 mg

REVENDICATIONS

1.- Nouveaux composés hétérocycliques caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule I



dans laquelle

les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,

les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R₁ adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,

R₂ représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,


R₃ et R₄, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R₃ et R₄ forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone, R₅ représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne

droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et

X représente le groupe méthylène ou carbonyle et

- trois substituants R, R₁ et R₂ au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R, R₁ et R₂ au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,
 - R₁ et R₂ ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et
 - deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,
- et les sels que ces composés forment avec des acides minéraux ou organiques.

2.- Nouveaux composés hétérocycliques caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule Ia



(Ia)

dans laquelle

les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,

les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R₁ adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy, R₂ représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un

groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,

R_3 et R_4 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone,

- 5 un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R_3 et R_4 forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone,
- 10 R_5 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et

- trois substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un

15 cycle quelconque,

- R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et

- deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,


- 20 et les sels que ces composés forment avec des acides minéraux ou organiques.

3.- Nouveaux composés hétérocycliques caractérisés en ce qu'ils sont choisis parmi la 3-(3,4-dichlorophényl)-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-isocoumarine, la 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(p-méthoxy-phényl)isocoumarine, la 3,4-dihydro-3-[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl]-3-phényl-isocoumarine, la 3,4-dihydro-3-(2-morpholino-éthyl)-3-phényl-isocoumarine, la 3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine, la 3-(2-diallylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(o-tolyl)isocoumarine, et les sels que ces composés forment avec des acides minéraux ou organiques.

25 30

4.- La 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine et les sels que ce composé forme avec des acides minéraux ou organiques.

5.- Nouveaux composés hétérocycliques caractérisés en ce qu'ils répondent à la formule Ib



15 dans laquelle

les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,

20 les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R₁ adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,

25 R₂ représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,

R₃ et R₄, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone,

30 un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R₃ et R₄ forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de

35 carbone,


R_5 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et

- trois substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,
 - R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et
 - deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,
- et les sels que ces composés forment avec des acides minéraux ou organiques.

6.- Le 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-(p-méthoxy-phényl)-isochromanne et les sels que ce composé forme avec des acides minéraux ou organiques.

7.- Le 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3-phényl-isochromanne et les sels que ce composé forme avec des acides minéraux ou organiques.

8.- Un procédé de préparation des composés hétérocycliques répondant à la formule Ia




dans laquelle

- les substituants R , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluoro-


- méthyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,
les substituants R_1 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore,
5 un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R_1 adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,
 R_2 représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5
10 atomes de carbone,
 R_3 et R_4 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R_3 et R_4 forment ensemble, avec l'atome
15 d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone,
 R_5 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne
20 droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et
- trois substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque;
25 - R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et
- deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,
et de leurs sels, caractérisé en ce qu'on cyclise, par chauffage
30 à une température supérieure à 100°, un composé de formule II

(formule II voir page suivante)




dans laquelle R, R₁, R₂, R₃, R₄ et R₅ ont les significations déjà données et R₇ représente un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou un groupe benzyle, et on transforme les composés de formule Ia ainsi obtenus en leurs sels par réaction avec des acides organiques ou minéraux.

9.- Un procédé de préparation des composés hétérocycliques répondant à la formule Ib



30 dans laquelle
 les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,
 35 les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore,

- un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R_1 adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy, R_2 représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un
- 5 groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,
- R_3 et R_4 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le
- 10 groupe benzyle, ou bien R_3 et R_4 forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone, R_5 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne
- 15 droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et
- trois substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,
- 20 - R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et
- deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,
- et de leurs sels, caractérisé en ce qu'on réduit un composé
- 25 de formule Ia



30


35

dans laquelle R, R₁, R₂, R₃, R₄ et R₅ ont les significations déjà données, par un borohydrure de métal alcalin dans un solvant organique inerte et en présence d'éthérate de trifluorure de bore à une température comprise entre -20 et 80°, et on traite le produit d'addition ainsi obtenu par un acide concentré, à une température comprise entre 40° et la température de reflux du mélange réactionnel, et on transforme les composés de formule Ib ainsi obtenus en leurs sels par réaction avec des acides organiques ou minéraux.

10.- Un procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'on utilise le borohydrure de sodium ou de lithium.

11.- L'application en thérapeutique des composés hétérocycliques spécifiés à l'une quelconque des revendications 1 à 7, à titre de principes actifs de médicaments.

12.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en ce qu'il contient, à titre de principe actif, un composé hétérocyclique répondant à la formule I




dans laquelle les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore,

- un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R_1 adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,
 R_2 représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un
- 5 groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,
- R_3 et R_4 , qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le
- 10 groupe benzyle, ou bien R_3 et R_4 forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone,
- 15 R_5 représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et
- X représente le groupe méthylène ou carbonyle et
- trois substituants R , R_1 et R_2 au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R , R_1 et R_2 au plus
- 20 ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,
- R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et
 - deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des
- 25 atomes de carbone voisins,
- à l'état de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.

- 13.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en
- 30 ce qu'il contient, à titre de principe actif, un composé hétérocyclique répondant à la formule Ia

(formule Ia voir page suivante)



dans laquelle

les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5

les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R₁ adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,

R₂ représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,

R₃ et R₄, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R₃ et R₄ forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone,

R₅ représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et

- trois substituants R, R₁ et R₂ au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R, R₁ et R₂ au plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,

- R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et
- deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,

5 à l'état de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.


14.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en ce qu'il contient, à titre de principe actif, un composé hétérocyclique
10 choisi parmi -----
la 3-(3,4-dichlorophényl)-3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-isocoumarine, la 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(p-méthoxy-phényl)isocoumarine, la 3,4-dihydro-3-[2-(4-méthyl-1-pipérazinyl)éthyl]-3-phényl-isocoumarine, la 3,4-
15 dihydro-3-(2-morpholino-éthyl)-3-phényl-isocoumarine, la 3-(2-diméthylamino-1-méthyl-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine, la 3-(2-diallylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-(o-tolyl)isocoumarine, à l'état de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.

20 15.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en ce qu'il contient, à titre de principe actif, la 3-(2-diméthylamino-éthyl)-3,4-dihydro-3-phényl-isocoumarine, sous forme de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.
25

16.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en ce qu'il contient, à titre de principe actif, un composé hétérocyclique répondant à la formule Ib

30

(formule Ib voir page suivante)



dans laquelle

- les substituants R, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone,
- les substituants R₁, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle, un groupe alkyle ou alcoxy contenant chacun de 1 à 5 atomes de carbone, ou bien deux substituants R₁ adjacents forment ensemble le groupe méthylènedioxy,
- R₂ représente un atome d'hydrogène, de fluor ou de chlore, un groupe trifluorométhyle ou un groupe alcoxy contenant de 1 à 5 atomes de carbone,
- R₃ et R₄, qui peuvent être identiques ou différents, représentent chacun un groupe alkyle contenant de 1 à 5 atomes de carbone, un groupe alcényle contenant de 2 à 5 atomes de carbone ou le groupe benzyle, ou bien R₃ et R₄ forment ensemble, avec l'atome d'azote, un groupe 1-pyrrolidinyle, pipéridino, 1-azépinyle, 1-azocinyle, morpholino, thiomorpholino ou 4-alkyl-1-pipérazinyle dans lequel le groupe alkyle contient de 1 à 5 atomes de carbone,
- R₅ représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle à chaîne droite contenant de 1 à 5 atomes de carbone et
- trois substituants R, R₁ et R₂ au plus ont des significations autres que l'hydrogène et deux substituants R, R₁ et R₂ au

72 11734

plus ont des significations autres que l'hydrogène sur un cycle quelconque,

- R_1 et R_2 ne représentent pas simultanément un atome d'halogène, et

5 - deux groupes trifluorométhyle ne peuvent être fixés sur des atomes de carbone voisins,

à l'état de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.

10 17.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en ce qu'il contient, à titre de principe actif, le 3-(2-diméthyl-amino-éthyl)-3-(p-méthoxy-phényl)-isochromanne, à l'état de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.

15 18.- Un médicament exerçant notamment une action diurétique et hypotensive/antihypertensive, caractérisé en ce qu'il contient, à titre de principe actif, le 3-(2-diméthyl-amino-éthyl)-3-phényl-isochromanne, à l'état de base libre ou sous forme d'un sel acceptable du point de vue pharmaceutique.

20 19.- Une composition pharmaceutique caractérisée en ce qu'elle contient l'un au moins des principes actifs spécifiés à l'une quelconque des revendications 12 à 18, en association avec des excipients et véhicules acceptables du point de vue pharmaceutique.